

سوالات استخدامی

اصول و روش های بیهودشی

www.topsoal.ir

تپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



[topsoal.ir](https://www.instagram.com/topsoal_ir/)



[topsoal](https://t.me/topsoal_ir)

درس اصول و روش های بیهودگی

۱- در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲، کدام مورد باید در ارزیابی پیش از عمل جراحی بررسی شود؟

(۱) وجود نوروپاتی

(۲) مشکل در لوله گذاری

(۳) وجود کتواسیدوز دیابتی

(۴) تأخیر در تخلیه معده

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

مشکل در لوله گذاری در بیماران دیابتی به دلیل تغییرات بافتی و محدودیت حرکت مفاصل گردنی اهمیت دارد و باید پیش از عمل جراحی بررسی شود.

۲- کدام یک از محلول های کریستالوئیدی زیر ترکیب اسیدی تری دارد؟

(۱) پلاسمالیت A

(۲) نرمول R

(۳) رینگر لاکتان

(۴) سدیم کلراید ۹ درصد

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

سدیم کلراید ۹ درصد دارای pH پایین تری است و نسبت به سایر محلول های کریستالوئیدی خاصیت اسیدی تری دارد.

۳- در میان بیماران زیر، احتمال بروز سندروم کمپارتمان به عنوان عارضه پس از عمل جراحی در کدام بیشتر است؟

۱) بیمار مبتلا به ایسکمی قلبی در وضعیت ترندلبرگ

۲) بیمار مبتلا به هایپرتانسیون در وضعیت پرون

۳) بیمار مبتلا به نوروپاتی در وضعیت سوپاین

۴) بیمار مبتلا به پلیسیتمی در وضعیت لیتوتومی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴
وضعیت لیتوتومی به دلیل کاهش بازگشت وریدی و افزایش فشار داخل عضلات اندام تحتانی، می‌تواند خطر سندروم کمپارتمان را افزایش دهد.

۴- بیماری ۵۱ ساله جهت انجام عمل جراحی چشم تحت بیهودگی عمومی قرار گرفته است. لوله‌گذاری برای این بیمار مشکل بوده و بر اساس طبقه‌بندی مالمپاتی در کلاس چهار قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط بیمار، بهترین زمان برای خارج کردن لوله تراشه کدام است؟

۱) بیهودگی عمیق

۲) بیهودگی سبک

۳) بیدار

۴) قبل از برگشت رفلکس‌های راه هوایی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

خارج کردن لوله تراشه در بیمارانی که لوله‌گذاری دشوار دارند، باید در حالت بیدار انجام شود تا از انسداد راه هوایی و عوارض ناشی از آن جلوگیری شود.