

سوالات استخدامی بارداری و زایمان ۳ و ۴

www.topsoal.ir

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

درس بارداری و زایمان ۳ و ۴

۱- کدامیک از اقدامات زیر در موقعیت ابتلای به آمبولی مایع آمنیون صحیح می باشد؟

- ۱) انجام احیاء قلبی - ریوی
- ۲) حفظ درجه حرارت در سطح ۳۸ درجه سانتی گراد
- ۳) حفظ میانگین فشار شریانی در سطح ۹۵ میلی متر جیوه
- ۴) تجویز مایعات برای اتساع بطن راست

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

در آمبولی مایع آمنیون، تجویز مایعات برای اتساع بطن راست جهت افزایش فشار خون و حفظ عملکرد قلبی عروقی ضروری است.

۲- جنانجه شروع علائم بالینی آبله مرغان (Varicella) در مادر باردار ۴ روز قبل از زایمان یا ۲ روز پس از آن باشد، اقدام ضروری چیست؟

- ۱) ایمونوگلوبولین زوستر به نوزاد تزریق شود
- ۲) درمان دارویی برای نوزاد تزریق شود
- ۳) ایمونوگلوبولین زوستر به مادر باردار تزریق شود
- ۴) ویروس آبله مرغان قابل سرایت به نوزاد نیست

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

اگر مادر باردار در ۴ روز قبل یا ۲ روز بعد از زایمان علائم آبله مرغان نشان دهد، باید به مادر ایمونوگلوبولین زوستر تزریق شود تا از انتقال ویروس به نوزاد جلوگیری شود.

۳- محل تزریق واکسن ب.ث.ژ کدام است؟

- (۱) زیر جلد / بازو
- (۲) درون پوست / ساعد
- (۳) داخل عضله / بازو
- (۴) داخل جلد / بازو

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

واکسن ب.ث.ژ باید در پوست، معمولاً در ساعد تزریق شود.

۴- برای اداره پارگی پیش از موعد و پره نرم پرده ها، در کدامیک از آستین حاملگی زیر پروفیلاکسی استرپتوکوک گروه B توصیه نمی شود؟

- (۱) کمتر از ۲۴ هفته
- (۲) ۲۴ هفته تا ۳۱ هفته کامل
- (۳) ۳۲ هفته تا ۳۳ هفته کامل
- (۴) ۳۴ هفته و بیشتر

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

پروفیلاکسی استرپتوکوک گروه B در حاملگی کمتر از ۲۴ هفته توصیه نمی شود، زیرا خطر عفونت نسبت به نوزاد بسیار کم است.