

سوالات استخدامی بیماری زنان و ناباروری

www.topsoal.ir

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

درس بیماری زنان و ناباروری

۱- برای نمونه برداری از آندومتر جهت بررسی علل نازایی، کدام زمان از سیکل قاعدگی مناسب است؟

- ۱) اوایل فاز تکثیر رحم
- ۲) یک روز قبل از تخمک گذاری
- ۳) اواسط فاز لوتئینی تخمدان
- ۴) اواخر فاز ترشحي رحم

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

نمونه برداری از آندومتر باید در اواسط فاز لوتئینی تخمدان انجام شود زیرا این زمان بهترین نقطه برای بررسی تغییرات آندومتر جهت تشخیص مشکلات هورمونی و نازایی است.

۲- خانمی ۲۸ ساله با درد زیر شکم در سمت راست مراجعه نموده است. در مشاهدات سونوگرافی توده ای توپر به قطر 5×6 سانتی متر در تخمدان راست مشاهده می شود. کدام اقدام ارجح است؟

- ۱) تحت نظر داشتن بیمار و معاینات مکرر هر ۶ ماه یکبار
- ۲) لاپاراتومی و برداشتن توده
- ۳) تجویز OCP و تکرار سونوگرافی سه هفته بعد
- ۴) تکرار سونوگرافی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

در صورت مشاهده توده در تخمدان، تجویز OCP می تواند به تنظیم هورمون ها کمک کرده و نیاز به بررسی دوباره پس از سه هفته ممکن است توده را در موقعیت مناسب تری برای ارزیابی قرار دهد.

۳- مددجو با شکایت دیسمنوره دیسپارونی - درد لگنی و نازایی مراجعه نموده و دارای طول سیکل کوتاه شده و مدت قاعدگی طولانی است. تشخیص احتمالی کدام است؟

(۱) PID

(۲) اندومتریوز

(۳) ادنومیوز

(۴) سالیسیت

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

اندومتریوز ممکن است با دردهای لگنی، دیسمنوره و نازایی همراه باشد و سیکل قاعدگی کوتاه و مدت طولانی آن نیز یکی از علائم آن است.

۴- در ارتباط با تشخیص لیومیوم زیرمخاطی کدام روش مناسب نیست؟

(۱) هیستروسکوپی

(۲) اولتراسکوگرافی

(۳) سونوهیستروگرام

(۴) هیستروولینگوگرام

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

هیستروولینگوگرام بیشتر برای ارزیابی مشکلات ساختاری لوله‌های فالوپ استفاده می‌شود و در تشخیص لیومیوم زیرمخاطی کاربرد ندارد.