

سوالات استخدای

بیہوشی و احیای قلبی - ریوی

www.topsoal.ir

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدای

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

درس بیهوشی و احیای قلبی - ریوی

۱- در فالتز دهلیزی مقدار انرژی برای شوک اول چقدر است؟

(۱) ۱۲۰-۲۰۰ بای فازیک

(۲) ۲۰۰-۳۰۰ مونوفازیک

(۳) ۲۵۰-۳۰۰ بای فازیک

(۴) ۲۰۰ مونوفازیک

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

مقدار انرژی برای شوک اول در دستگاه‌های بای فازیک معمولاً بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ ژول است.

۲- بیمار آقای ۶۰ ساله به علت تصادف در بزرگراه با خونریزی از گوش و بینی بلافاصله در بخش اورژانس بستری شده است. کدام اقدام در اولویت قرار دارد؟

(۱) آماده نمودن بیمار برای MRI

(۲) ناشتا نگه داشتن بیمار

(۳) کنترل جذب و دفع بیمار

(۴) کنترل سطح هوشیاری و علائم حیاتی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

کنترل سطح هوشیاری و علائم حیاتی در ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد، به ویژه در بیمارانی با تروما و خونریزی.

۳- حداکثر سرعت فشردن قفسه سینه در اقدامات احیا چند بار در دقیقه است؟

(۱) ۶۰

(۲) ۹۰

(۳) ۱۰۰

(۴) ۱۲۰

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

سرعت فشردن قفسه سینه باید حداقل ۱۰۰ بار در دقیقه باشد و تا ۱۲۰ بار در دقیقه نیز می‌تواند افزایش یابد.

۴- تعداد تهویه در دقیقه برای یک بزرگسال در شرایط احیای قلبی ریوی پایه، وجود لوله تراشه پس از بازگشت، نبض مرکزی به ترتیب عبارت است از:

(۱) ۱۰، ۱۲، ۱۰

(۲) ۱۲، ۱۲۰، ۱۲۰

(۳) ۸، ۸، ۸

(۴) ۵، ۸، ۱۰

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

تعداد تهویه در دقیقه برای یک بزرگسال با لوله تراشه و وجود نبض مرکزی، به ترتیب ۱۰، ۱۲ و ۱۰ می‌باشد.

۵- در لوله گذاری نای لوله بیشتر در کدام برونش وارد می‌شود؟

(۱) برونش راست

(۲) برونش چپ

(۳) هر دو

(۴) کارینا