

## سوالات استخدامی

# تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

[www.topsoal.ir](http://www.topsoal.ir)

تپ سوال - مرجع اخباره، منابع و سوالات استعدادی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



[topsoal.ir](https://www.instagram.com/topsoal_ir/)



[topsoal](https://t.me/topsoal_ir)

## درس تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

۱- میزان طبیعی زمان پارشیال ترومبوپلاستین PTT چقدر است؟

- (۱) ۲۵ تا ۳۰ ثانیه
- (۲) ۲۳ تا ۳۵ ثانیه
- (۳) ۱۸ تا ۲۵ ثانیه
- (۴) ۳۳ تا ۴۰ ثانیه

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

میزان طبیعی زمان پارشیال ترومبوپلاستین معمولاً بین ۲۳ تا ۳۵ ثانیه است.

۲- در سندرم کمپارتمان، چه فشاری الزام فاشیوتومی را مطرح می‌کند؟

- (۱) فشار بیش از ۱۰ میلی متر جیوه
- (۲) فشار بیش از ۴۰ میلی متر جیوه
- (۳) فشار بیش از ۲۰ میلی متر جیوه
- (۴) فشار بیش از ۳۰ میلی متر جیوه

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

در سندرم کمپارتمان، فشار بیش از ۲۰ میلی متر جیوه ممکن است نیاز به انجام فاشیوتومی را مطرح کند.

### ۳- محل مناسب ورود گاز در جراحی‌های لپاراسکوپی برای کودکان در کدام ناحیه است؟

- ۱) محل مناسب ورود گاز برای کودکان ناحیه ایی گاستر چپ با هایپوکندریوم راست می‌باشد.
- ۲) محل مناسب ورود گاز برای کودکان قسمت تحتانی ناف در امتداد خط Lina Alba می‌باشد.
- ۳) محل مناسب ورود گاز برای کودکان ناحیه هایپوگاستر چپ با هایپوکندریوم راست می‌باشد.
- ۴) محل مناسب ورود گاز برای کودکان ناحیه ایی گاستر چپ یا هایپوکندریوم چپ می‌باشد.

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۲

برای کودکان، محل مناسب ورود گاز در جراحی‌های لپاراسکوپی معمولاً قسمت تحتانی ناف در امتداد خط Lina Alba است.

### ۴- در شرایط حضور بر بالین بیماری که در حضور تیم امدادی به صورت شاهد بدون پاسخ گشته و تنفس‌های موثر حرکت قفسه سینه ندارد. کدام اقدام اولویت دارد؟

- ۱) فرستادن تکنسین دوم برای آوردن دستگاه AED از آمبولانس در صورت موجود بودن
- ۲) معاينه مردمک از نظر پاسخ‌دهی به نور
- ۳) باز کردن راه هوایی و دادن تنفس
- ۴) فشردن قفسه سینه

پاسخ تیم آموزشی تاب سوال: گزینه ۴

اولویت در این شرایط، فشردن قفسه سینه است که در قالب CPR انجام می‌شود.

### ۵- پوزیشن مریض و نوع دسترسی جراحی در آناستاموز شریانی مغز چگونه است؟

- ۱) لترال کرانیکتومی تمپورال

- ۲) سوپاین کرانیوتومی ساب اکسی پیتال

- ۳) لترال کرانیوتومی اکسی پیتال

- ۴) سوپاین کرانیکتومی تمپورال