

سوالات استخدای جراحی عمومی و زنان و زایمان (پاسخنامه تشریحی)

www.topsoal.ir

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدای

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

درس جراحی عمومی و زنان و زایمان

۱- مهم ترین اقدام اولیه در مواجهه با بیمار دارای درد شکمی حاد همراه با دفاع عضلانی و علائم پریتونیت چیست؟

- ۱) شروع آنتی بیوتیک وسیع الطیف
- ۲) گرفتن شرح حال کامل و شرح درد
- ۳) انجام لاپاروتومی فوری
- ۴) بررسی با CT Scan شکمی با کنتراست خوراکی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

در مواجهه با پریتونیت، آنتی بیوتیک فوری قبل از تصویربرداری یا جراحی ضروری است، چرا که خطر سپسیس وجود دارد. البته جراحی اغلب نیاز می شود، اما درمان حمایتی و آنتی بیوتیک اولویت دارد.

۲- کدام یک از نشانه های زیر، اختصاصی ترین علامت آپاندیسیت حاد در معاینه فیزیکی است؟

- ۱) علامت بلومبرگ
- ۲) درد ناحیه مک برنی
- ۳) علامت روسوینگ
- ۴) افزایش درد با بلند کردن پای راست

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

درد در نقطه مک برنی اختصاصی ترین و کلاسیک ترین علامت آپاندیسیت حاد است؛ دیگر علائم نیز مفیدند اما حساسیت یا اختصاصیت کمتری دارند.

۳- در بیماری که دچار درد شکمی مبهم، تهوع و نفخ است و صدای روده‌ای پرطنین دارد، محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

(۱) انسداد روده

(۲) زخم معده

(۳) سنگ صفراوی

(۴) پانکراتیت حاد

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

صدای روده‌ای پرطنین و شکم متورم با تهوع و درد مبهم از یافته‌های کلاسیک انسداد روده‌ای هستند.

۴- در مورد تشخیص خونریزی دستگاه گوارش فوقانی، کدام گزینه تشخیصی با حساسیت و ارزش تشخیصی بالا در فاز حاد کاربرد دارد؟

(۱) آنژیوگرافی

(۲) اسکن تالیوم

(۳) اندوسکوپی فوقانی

(۴) لاوار معده

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

اندوسکوپی فوقانی بهترین و سریع‌ترین ابزار تشخیص و درمان خونریزی گوارش فوقانی در فاز حاد است.