

## سوالات استخدامی

### داخلی جراحی

[www.topsoal.ir](http://www.topsoal.ir)

تپ سوال - مرجع اخباره، منابع و سوالات استعدادی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



topsoal.ir



topsoal

## درس داخلی جراحی

۱- کدامیک از تشخیص‌های پرستاری زیر برای مددجو مبتلا به دیابت بی مزه مطرح است؟

- (۱) اختلال افزایش حجم مایعات
- (۲) اختلال در الگوی تنفسی
- (۳) اختلال در تصویر ذهنی از خویشتن
- (۴) اختلال در الگوی خواب

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

دیابت بی مزه با افزایش حجم ادرار و کاهش آب بدن همراه است. بنابراین، تشخیص پرستاری مرتبط با این وضعیت افزایش حجم مایعات است، زیرا فرد در معرض کم آبی و تغییرات الکترولیتی قرار دارد.

۲- پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران، کدام یک از عوارض زیر بایستی به دلیل احتمال DVT مورد بررسی قرار گیرد؟

- (۱) خطر خونریزی از محل تزریق، درد اندام‌های انتهایی، راش پوستی
- (۲) درد شدید، ورم یک طرفه، سرخی در مسیر ورید
- (۳) در موقع جایه جایی اندام، نشت مایع بین سلولی از ناحیه جراحی
- (۴) عدم تعادل همودینامیک، تهوع، استفراغ، هموپتری

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲

درد شدید، ورم یک طرفه و سرخی در مسیر ورید از علائم اصلی DVT هستند. این علائم باید در بیمارانی که پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران در معرض تشکیل لخته خون قرار دارند، به دقت بررسی شوند.

۳- در مددجو مبتلا به کدام بیماری، تشخیص پرستاری «احتمال بروز صدمه در رابطه با عدم تعادل و سرگیجه»، مطرح است؟

۱) اگزوستوز

۲) پارگی پرده صماخ

۳) کلستاتوم

۴) ماستوئید

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۲  
پارگی پرده صماخ می‌تواند باعث سرگیجه و عدم تعادل شود. این وضعیت معمولاً به دلیل آسیب به ساختارهای گوش داخلی که مسئول تعادل هستند، ایجاد می‌شود.

۴- در آموزش به بیمار بعد از جراحی دیسک بین مهره ای کدام مورد صحیح است؟

۱) اجتناب از کفش پاشنه کوتاه

۲) استفاده از پوزیشن پرون

۳) ورزش گردن با خم و راست یا چرخاندن گردن

۴) اجتناب از ایستادن یا نشستن بیش از ۳۰ دقیقه

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

پس از جراحی دیسک بین مهره ای، مهم است که بیمار از ایستادن یا نشستن طولانی مدت خودداری کند تا فشار اضافی به ناحیه کمر وارد نشود و فرآیند بهبودی تسریع یابد.