

## سوالات استخدامی

# موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)

[www.topsoal.ir](http://www.topsoal.ir)

تپ سوال - مرجع اخباره، منابع و سوالات استعدادی

تیم آموزشی تپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی بوداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.



[topsoal.ir](https://www.instagram.com/topsoal_ir/)



[topsoal](https://t.me/topsoal_ir)

## درس موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)

۱- بهترین اقدام مناسب برای بیمار دچار هایپرترمی کدام است؟

- ۱) اسپری آب ۱۵ درجه و استفاده از فن
- ۲) اسپری آب ۲۵ درجه و استفاده از فن
- ۳) اسپری آب سرد و استفاده از فن
- ۴) قرار دادن کیسه یخ در دست و پا و صورت بیمار

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

برای کاهش دمای بدن در هایپرترمی، استفاده از آب سرد و فن موثرترین روش است. آب سرد باعث کاهش دما و فن به تبخیر آن کمک می‌کند.

۲- خانم ۲۴ ساله باردار در هفته ۳۱ بارداری دچار سردرد شدید و درد اپیگاستر شده است. حین انتقال به بیمارستان دچار تشنج توئیک کلونیک می‌شود. موثرترین درمان برای پیشگیری از تشنج‌های بعدی در این بیمار کدام است؟

- ۱) دیازپام
- ۲) فنی تویین
- ۳) بی‌کربنات سدیم
- ۴) سولفات منیزیم

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

سولفات منیزیم درمان استاندارد برای پیشگیری از تشنج‌های ناشی از مسمومیت بارداری (پره‌اکلامپسی) است. این دارو اثرات ضد تشننجی دارد.

۳- کودک ۵ ساله‌ای متعاقل گزش زنبور دچار تورم صورت و لب‌ها، تنگی نفس، تهوع، درد شکم و دیسترس تنفسی شده است. اقدام مناسب کدام گزینه است؟

- ۱) اپی نفرین ۳.۰ میلی گرم عضلانی
- ۲) اپی نفرین ۵.۰ میلی گرم عضلانی
- ۳) هیدروکورتیزون وریدی
- ۴) درمان‌های حمایتی

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

در صورت واکنش آلرژیک شدید، اپی نفرین ۳.۰ میلی گرم عضلانی اولین درمان انتخابی است تا به سرعت علائم آلرژیک و تنفسی کنترل شود.

۴- خاتمه به دنبال زایمان، یک ساعت قبل دچار تداوم خونریزی واژینال شده است. با توجه به فاصله حدود یک ساعته تا مرکز درمانی کدام اقدام زیر درست نمی‌باشد؟

- ۱) جست و جوی بقایای جفتی در رحم
- ۲) چک واژن با گاز استریل
- ۳) تزریق نرمال سالین
- ۴) اقدامی لازم ندارد

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

در خونریزی‌های واژینال پس از زایمان، جست‌وجوی بقایای جفتی و اقدامات حمایتی از جمله تزریق مایعات ضروری است. از انجام اقدامات بدون بررسی دقیق وضعیت باید پرهیز کرد.