

## سوالات استخدامی

# کاهش هوشیاری و بررسی عوامل ایجاد آن

[www.topsoal.ir](http://www.topsoal.ir)

تاپ سوال - مرجع اخبار، منابع و سوالات استخدامی

تیم آموزشی تاپ سوال با تلاش فراوان این بسته مطالعاتی را گردآوری و ثبت نموده است هر گونه کپی برداری کل یا بخشی از این بسته غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

## درس کاهش هوشیاری و بررسی عوامل ایجاد آن

۱- کدام علامت، از شکایات شایع آنافیلاکسی در سیستم گوارشی است؟

- (۱) یبوست
- (۲) انسداد روده
- (۳) درد شکم
- (۴) پارگی روده‌ها

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

درد شکمی یکی از علائم شایع آنافیلاکسی در سیستم گوارشی است که به دلیل واکنش‌های آلرژیک و التهاب در دستگاه گوارش رخ می‌دهد.

۲- در آنافیلاکسی، کدام عضو کمترین واکنش را نشان می‌دهد؟

- (۱) راه هوایی
- (۲) دستگاه گوارش
- (۳) قلبی - عروقی
- (۴) پوست

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۴

پوست معمولاً اولین محل درگیری در آنافیلاکسی است، اما واکنش‌های شدید معمولاً سیستم تنفسی و قلبی-عروقی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، در حالی که پوست کمترین واکنش را نشان می‌دهد.

۳- بیمار دیابت نوع I، بیشتر با کدام علامت مراجعه می کند؟

- (۱) کتواسیدوز دیابتی
- (۲) اورژانس هیپوگلیسمی
- (۳) علائم پرنوشی و پرادراری
- (۴) بدون علامت در آزمایش روتین

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۳

در دیابت نوع I، شایع ترین علائم شامل پرنوشی (پلی دیپسی) و پرادراری (پلی اوری) است که به دلیل افزایش سطح گلوکز خون رخ می دهد.

۴- بیماری با کاهش هوشیاری و بدون هیچ سابقه ای، دارای قند خون ۵۵ است. در خصوص تشخیص بیماری کدام مورد صحیح است؟

- (۱) تشخیص هیپوگلیسمی است.
- (۲) کاهش هوشیاری، تشخیص هیپوگلیسمی را رد می کند.
- (۳) فقط در صورت باردار بودن، تشخیص هیپوگلیسمی است.
- (۴) فقط در کودک زیر ۸ سال، تشخیص هیپوگلیسمی است.

پاسخ تیم آموزشی تاپ سوال: گزینه ۱

قند خون کمتر از ۷۰ میلی گرم در دسی لیتر به عنوان هیپوگلیسمی در نظر گرفته می شود، به ویژه اگر با کاهش هوشیاری همراه باشد.